

7枚入

テープ

経皮鎮痛消炎剤

経皮鎮痛消炎剤

テープ

7枚入

NOVARTIS

第2類医薬品

無臭性

シウになっても
貼り直しやすい!腰、背中の
痛みには、スバ。!1日1回
24
時間効<鎮痛力+浸透力+持続力
ジクロフェナク 30mg配合
ナトリウム

テープ



EX

ボルタレン

Voltaren EX

7枚入 (10×14cm)
L (大判) サイズ

経皮鎮痛消炎剤

ボルタレンEXテープ

第2類医薬品

7枚入

使用期限
製造番号

1501A8

7枚入

第2類医薬品

有効成分 ジクロフェナクナトリウム

テープ

ボルタレン EX

テープ

7枚入 (10×14cm)

ご使用に際しては、この外箱の説明文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特徴

- 有効成分ジクロフェナクナトリウムを配合した鎮痛消炎テープ剤で、優れた経皮吸収性があります。
- 有効成分が徐々に放出され、優れた持続性があります。1日1回使用。
- 有効成分が外部に揮散せず、痛みのもとを狙って作用します。
- 貼った部分からじんわり心地よい清涼感が広がります。
- 貼りやすい、貼り直しやすい、たて・よこ伸縮自在のテープ剤です。
- 臭いはほとんどありません。

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、
腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘
など)、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1枚を患部
に貼ってください。ただし、1回あたり1枚を超えて
使用しないでください。なお、本成分を含む他の
外用剤を併用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)1回あたり24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3)本剤は、痛みやはれなどの原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)使用部位に他の外用剤を併用しないでください。

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
●電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

成分 (膏体100g中ジクロフェナクナトリウム1g)

1枚(10×14cm)あたり膏体量3.0g
ジクロフェナクナトリウム30mg 配合

添加物:脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、ポリイソブチレン、N-メチル-2-ピロリドン、ジブチルヒドロキシトルエン、トメントール、その他2成分

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)品質保持のため、開封後の未使用分はもとの袋に入れ、開口部をきちんと閉めて保管してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

【お問い合わせ先】

製品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。
ノバルティス ファーマ株式会社 お客様相談室
〒105-6333 東京都港区虎ノ門1-23-1
●電話:03(5766)2615
●受付時間:9:00～17:00
(土日祝・その他当社休業日を除く)
●製品に関する情報はこちら
<http://www.voltaren-ex.jp>



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります。)

- 1.次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)15才未満の小児
- 2.次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口 (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。
- 4.連続して2週間以上使用しないでください。

🗨 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人 (2)他の医薬品を使用している人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人 (5)次の診断を受けた人 消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ (6)次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤(アスピリン等)、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (7)高齢者
- 2.使用中又は使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(らくせつ)(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接 触 皮膚炎、 光 線 過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがる場合があります。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

開封口



4 987443 351738

製造販売元
同仁医薬化工株式会社
東京都中野区弥生町5-2-2

販売元
ノバルティス ファーマ株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1