


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

漢方製剤 かぜの初期・肩こり（乾式顆粒剤）
お湯に溶かして温服

カッコン湯エクス顆粒H



かぜのひきはじめて、体が冷えて、背筋がぞくぞくするときに温服してください。
本品はお湯にきれいに溶けて、おいしく服用できる漢方薬です。お湯に溶かして熱いうちに服用
されることをおすすめします。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・食欲不振、胃部不快感 |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
- | 症 状 の 名 称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝 機 能 障 害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| * 多 形 紅 斑 | 皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。 |
3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

◎効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

◎用法・用量

次の量を食前または食間に熱湯に溶かして温服する。またはそのまま水かお湯にて服用する。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7 才以上15才未満	2/3 包	
4 才以上 7 才未満	1/2 包	
4 才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

<用法・用量に関連する注意>

1. 4才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
2. 用法・用量を厳守すること。
3. 溶かして服用するときは、熱湯を加えスプーンなどでかき混ぜて溶かし、早めに服用すること。
服用した後に、溶け残りがある場合には、熱湯を加えてかき混ぜて溶かし、残らず服用すること。

◎成分・分量 1日量3包(1包4.0g)中

葛根湯エキス 4.25 g

カッコン..... 4.0 g	マオウ..... 3.0 g	ショウキョウ..... 1.0 g
タイソウ..... 3.0 g	ケイヒ..... 2.0 g	シャクヤク..... 2.0 g
カンゾウ..... 2.0 g		

より製した乾燥エキス

添加物：白糖、乳糖、D-マンニトール、ショ糖脂肪酸エステルを含有

◎保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を二回折り返して保管し、2日以内に服用すること。



こんな症状の方におすすめします

- 汗ばんでいない、さらっとした肌の状態で、熱があって寒気がし、背筋がぞくぞくするようなかぜの症状に効果があります。頭痛や悪寒のあるときにも有効です。
- 肩こりや筋肉痛、パソコンなどの疲労からくる手や肩の痛みをやわらげます。背筋のこりにも有効です。
- 眠くなる成分は入っていません。運転なさる方や受験生の方なども安心して服用できます。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土、日、祝日を除く）