

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

漢方製剤 かぜの初期・肩こり（乾式顆粒剤）
お湯に溶かして温服

カコンゾ湯エキス顆粒H



かぜのひきはじめて、体が冷えて、背筋がぞくぞくするときに温服してください。
本品はお湯にきれいに溶けて、おいしく服用できる漢方薬です。お湯に溶かして熱いうちに服用されることをおすすめします。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

◎効能・効果

かぜの初期，鼻かぜ，かぜによる頭痛・肩こり

◎用法・用量

次の量を食前または食間に熱湯に溶かして温服する．またはそのまま，水かお湯にて服用する．

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7 才以上15才未満	2/3 包	
4 才以上 7 才未満	1/2 包	
4 才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で，前の食事から2～3時間後

用法・用量に関連する注意

4才以上の幼小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させること．

◎成分・分量 1日量3包(1包4.0g)中

葛根湯エキス……………4.25g		
カッコン……………4.0g	マオウ……………3.0g	ショウキョウ……………1.0g
タイソウ……………3.0g	ケイヒ……………2.0g	シャクヤク……………2.0g
カンソウ……………2.0g	より製した乾燥エキス	

添加物：白糖，乳糖，D-マンニトール，ショ糖脂肪酸エステルを含有

◎保管及び取扱い上の注意

- 1．直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること．
- 2．小児の手の届かない所に保管すること．
- 3．他の容器に入れ替えないこと．（誤用の原因になったり品質が変わる．）
- 4．1包を分割して服用した残りは，袋の口を二回折り返して保管し，2日以内に服用すること．
- 5．配置期限の過ぎた製品は使用しないこと．



こんな症状の方におすすめします

- 汗ばんでいない，さらっとした肌の状態で，熱があって寒気がし，背筋がぞくぞくするようなかぜの症状に効果があります．頭痛や悪寒のあるときにも有効です．
- 肩こりや筋肉痛，パソコンなどの疲労からくる手や肩の痛みをやわらげます．背筋のこりにも有効です．
- 眠くなる成分は入っていません．運転なさる方や受験生の方なども安心して服用できます．

製品についてのお問い合わせは，お届けした配置員または下記までお願いします．
北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30(土，日，祝日を除く)