

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

漢方 便 秘 藥 (錠剤)

大黄甘草湯エキス錠



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 高齢者。
- (6) 次の症状のある人。 むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関 係 部 位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 5～6日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

便秘

〔用法・用量〕

次の量を就寝前に水でかますに服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ增量（下記の最大量まで）または減量する。

年齢	1回量		1日服用回数
	2～3日便通がないとき (軽い便秘のとき)	4日以上便通がないとき (頑固な便秘のとき)	
成人（15才以上）	2～6錠	4～8錠	1回
5才以上15才未満	1～3錠	2～4錠	
5才未満	服用しないこと		

〔用法・用量に関する注意〕

5才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕 1日量8錠（1錠320mg）中

大黄甘草湯エキス…………… 1,000mg

（ダイオウ 4,000mg カンゾウ 1,000mg より製した乾燥エキス）

添加物：乳糖、セルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、タルクを含有

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わること。）
- ビン入りの場合は、服用のつどフタをよくしめること。
(ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがある)。



製品についてのお問い合わせは、お届けした配置員または下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号：076-472-1011

受付時間：9:00～16:30(土、日、祝日を除く)