

平成19年4月改訂

この説明文書は服用前に必ずお読みください
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください

漢方の医薬品

麻杏甘石湯

麻杏甘石湯エキス顆粒「トーア」

麻杏甘石湯(マキョウカンセキトウ)は、漢方の古典「傷寒論」に記載されているせき、ぜんそくの代表処方です。

本処方では麻黄(マオウ)、杏仁(キョウニン)、甘草(カンゾウ)、石膏(セッコウ)からなり、麻黄はせきを鎮め、杏仁は痰をとり、石膏は熱をさします。麻黄、杏仁、石膏が協力して、熱を冷まし、血行を盛んにしてのどのとおりをよくしてせきをしずめます。

【麻杏甘石湯エキス顆粒「トーア」はこんなときに】



せきが強く出て、口がかわき、自然に汗が出て熱感を伴うようなとき



せき、気管支ぜんそくでたんが切れにくいとき



小児ぜんそく、気管支ぜんそく、百日咳などにも用いられます。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)で軟便下痢になりやすい人。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等が現れる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

小児ぜんそく，気管支ぜんそく

【用法・用量】

下記の量を食前または食間にそのまま水かお湯で服用する。またはお湯を加えてかき混ぜて溶かし，熱いうちに服用する。

年 齢	1 回 量	服用回数
15歳以上(大人)	1 包	1 日 3 回
7 歳以上15歳未満	2/3 包	
4 歳以上7 歳未満	1/2 包	
4 歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1)小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。
- (3)溶かして服用した後，溶け残りがある場合にはお湯を加えて溶かし，残らず服用すること。

【性状，成分・分量】

麻杏甘石湯エキス顆粒「トーア」は次の成分を含有する褐色の顆粒剤です。
1 日量 3 包 (1 包 2.0 g) 中

成 分		含 有 量
麻杏甘石湯乾燥エキス		2.4g
マ オ ウ	4g	
キョウニン	4g	
カンゾウ	2g	
セッコウ	10g	
より製した乾燥エキス		

添加物：乳糖水和物，白糖を含有

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かないところに保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 1 包を分割して服用した残りは，袋の口を 2 回折り返して保管し，2 日以内に服用すること。



製品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記までお願いします。
株式会社三九製薬 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
電 話：076-472-1011
受付時間：月～金曜日 9:00～16:30 (土，日，祝日を除く)

製造販売元

999

株式会社三九製薬
富山県中新川郡上市町若杉55