

カヨイソウ

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること 🗣

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 次の症状のある人。むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
4. 5～6日間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能・効 果】

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

<効能・効果に関連する注意> 体力に関わらず、使用できる。

【用 法・用 量】

次の量を1日1回、就寝前に水でかまずに服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ増量(下記の最大量まで)または減量する。

年 齢	2～3日便通がないとき (軽い便秘のとき)	4日以上便通がないとき (頑固な便秘のとき)	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠～6錠	4錠～8錠	1 回
5才以上15才未満	1錠～3錠	2錠～4錠	
5才未満	服用しないこと		

<用法・用量に関連する注意>

5才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成 分・分 量】1日量8錠(1錠 320mg)中

大黃甘草湯エキス・・・・・・・・・・1000mg
(ダイオウ 4000mg カンゾウ 1000mg より製した乾燥エキス)

添加物:乳糖,タルク,セルロース,CMC-Ca,ステアリン酸Mg

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かないところに保管すること。

内容量 1000錠

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 北日本製薬株式会社 富山県中新川郡上市町若杉55 問い合わせ先 076-472-1011