

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

T-149B

第2類医薬品

とう き しゃく やく さんりょう

当帰芍薬散料エキス顆粒KM-2

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)胃腸の弱い人。
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能又は効果〕

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

〔用法及び用量〕

食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	2.5 g	3 回
小児 15歳未満 7 歳以上	1.6 g（約2/3匙）	
7 歳未満 4 歳以上	1.2 g（約1/2匙）	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)本剤は、4歳未満の乳幼児に服用させないこと。

〔成分及び分量〕 1日量(7.5g)中

当帰芍薬散エキス		4.00 g
〔日本薬局方	シャクヤク	4.0 g〕
日本薬局方	ソウジュツ	4.0 g
日本薬局方	タクシャ	4.0 g
日本薬局方	ブクリョウ	4.0 g
日本薬局方	センキュウ	3.0 g
日本薬局方	トウキ	3.0 g〕

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10
電話：03-3973-2917
○受付時間：9:00～17:00
(土、日、祝祭日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931

発売元 **一元製薬株式会社**
東京都豊島区要町3-4-10
製造販売元 **株式会社 カ ー ヤ**
(輸入元) 大阪府吹田市垂水町3-4-11