

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

T-163B

第2類医薬品

ほう ふう つう しょう さんりょう

防風通聖散料エキス顆粒KM

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5)発汗傾向の著しい人。
 - (6)高齢者。
 - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8)次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、*胃部不快感、腹部膨満、*はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系*	めまい*
そ の 他*	発汗、動悸、むくみ、頭痛*

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の治療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘*
4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能又は効果〕

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

〔用法及び用量〕

食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	2.5 g	3 回

〈用法及び用量に関連する注意〉

小児には服用させないこと。

〔成分及び分量〕 1 日量(7.5 g)中

防風通聖散料水製乾燥エキス 4.50 g

日本薬局方	カッセキ	3.0 g	日本薬局方	サンシシ	1.2 g
日本薬局方	オウゴン	2.0 g	日本薬局方	シャクヤク	1.2 g
日本薬局方	カンゾウ	2.0 g	日本薬局方	センキュウ	1.2 g
日本薬局方	キキョウ	2.0 g	日本薬局方	トウキ	1.2 g
日本薬局方	セッコウ	2.0 g	日本薬局方	ハッカ	1.2 g
日本薬局方	ビャクジュツ	2.0 g	日本薬局方	ハマボウフウ	1.2 g
日本薬局方	ダイオウ	1.5 g	日本薬局方	マオウ	1.2 g
日本薬局方外	硫酸ナトリウム	1.5 g	日本薬局方	レンギョウ	1.2 g
日本薬局方	ケイガイ	1.2 g	日本薬局方	ショウキョウ	0.3 g

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

〔お問い合わせ先〕

*

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

発 売 元 **一 元 製 薬 株 式 会 社**

東京都豊島区要町3-4-10

製造販売元 **株 式 会 社 カ ー ヤ**

（輸入元）大阪府吹田市垂水町3-4-11