

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

下痢、消化不良に

内外赤玉は5薬

第2類医薬品

下痢止め薬



使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (5) 高齢者。
- 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

〔用法・用量〕

次の量を水又はお湯と一緒にかまずに服用してください。

服用時間については特に決まっていますが、服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	6錠	3回を限度
11歳以上15歳未満	4錠	
8歳以上11歳未満	3錠	
5歳以上8歳未満	2錠	
3歳以上5歳未満	1錠	
3歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

(必ず裏面もお読みください)

〔成分・分量〕

1日量（18錠）中

成 分	分量	は た ら き
タンニン酸ベルベリン	300mg	殺菌作用により腸内の病原菌を殺菌し、収れん作用により下痢を止めます。
ウルソデオキシコール酸	30mg	利胆作用により、消化を助けます。
ゲンノショウコエキス (原生薬換算量 1500mg)	250mg	収れん作用により、下痢を止めます。
センブリ末	50mg	苦味健胃作用により、消化を助け、腹痛を止めます。

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、マクロゴール、赤色102号

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



〔包 装〕

54錠

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室
〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10
電 話：076 (478) 5580
受付時間：9：00～16：00（土、日、祝祭日を除く）



発売元
内外薬品株式会社
富山県富山市三番町3-10



製造販売元
東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10