

ここから
開けてください

第2類医薬品

販売名 インテゲル1%

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー
症状を起こしたことがある人。

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

(3) みずむし・たむし等または化粧し
ている患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または

登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦または妊娠していると思われ
る人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起
こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合 は副作用の可能性があるので、直ち に使用を中止し、この文書を持って医 師、薬剤師または登録販売者に相談 してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなら ない場合は使用を中止し、この文書 を持って医師、薬剤師または登録販 売者に相談してください

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛
み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・
手指の痛み)、肘の痛み(テニ
ス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を
患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 11歳以上の小児に使用さ
せる場合には保護者の指導監
督のもとに使用させていただきます。
(2) 11歳未満の小児には
使用させないでください。(3)
目に入らないよう注意してく
ださい。万一、目に入った場合
には、すぐに水またはぬるま
湯で洗ってください。なお、症
状が重い場合には、眼科医の
診療を受けてください。(4) 外
用におのみ使用してください。
(5) 1週間当たり50gを超え
て使用しないでください。(6)
薬剤塗擦後の患部をラップ
フィルムなどの通気性の悪
いもので覆わないでくださ
い。(7) 定められた用法・用量
をお守りください。



発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿井1丁目9番14号
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

インドメタシン局所吸収薬

インテゲル 1%

伸びがよく
清涼感のある

ゲル 50g

肩こりの
痛み

関節痛
腰痛

筋肉痛
腱鞘炎
肘の痛み
打撲
捻挫

【成分・分量】100g中

インドメタシン…1,000mg
L-メントール……3,000mg
添加物:ジイソプロパノール
アミン、エデト酸Na水和物、
エタノール、ベンジルアルコ
ール、カルボキシビニルポリ
マー、チオ硫酸Na水和物、ヒ
プロメロース、キサンタンガ
ム、1,3-ブチレングリコー
ル、ハアセチルしょ糖、N-メ
チル-2-ピロリドン

【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿
気の少ない涼しい所に密栓
して保管してください。(2) 小
児の手のとどかない所に保
管してください。(3) 他の容
器に入れかえないでくださ
い。(誤用の原因になり、品
質が変わる) (4) メガネ、時計、
アクセサリー等の金属類、化
織の衣類、プラスチック類、
床や家具などの塗装面等に
付着すると変質することが
ありますので、付着しないよう
注意してください。(5) 火気
に近づけないでください。(6)
本剤のついた手で、目などの
粘膜にふれないでください。
(7) 使用期限(外箱及びチュ
ープに記載)を過ぎた製品は
使用しないでください。

添付 説明書
薬 用 紙



第2類医薬品