

腰・関節・筋肉・肩こりの痛みに
インドメタシン局所吸収薬 **インテゲル1%**

- ◆消炎鎮痛成分インドメタシンが、痛みの原因物質（プロスタグランジンなど）の生成を抑え、
腫・関節・筋肉・肩こりの痛みなどにすぐれた効果を発揮します。
- ◆イーモントールを配合していますので、さらやかな潤滑感があります。
- ◆べとつきにくく、塗りやすい、伸びのあるゲル剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

①守らないと副作用の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)ばんそうこを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)目の周囲、粘膜等
 - (2)しっしん、かぶれ、傷口
 - (3)水虫・たむし等又は化膿している患部
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

- ・筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛
- ・関節痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)
- ・打撲、挫傷

用法・用量

1日4回を限度として適量を患部に塗布してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)15才未満の小児には使用させないでください。
- (3)15才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)1週間当たり50gを超えて使用しないでください。
- (7)塗布直後の患部をラップフィルム等の透気性の悪いもので覆わないでください。
- (8)使用後は、手を洗ってください。

成分・分量

(100g中)

成 分	含 量
インドメタシン	1,000mg
イーモントール	3,000mg

添付剤：ダイブプロパノールアミン、エデト酸Na水和物、エタノール、ベンジルアルコール、カルボキシビニルポリマー、チオ硫酸Na水和物、ヒプロメロース、キサンタンガム、1,3-ブチレングリコール、ハアセチルシロシ、N-メチル-2-ピロリドン含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)
- (4)本剤が衣類や家具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水で洗剤で洗い落とすしてください。
- (5)火気にかけてはいけません。
- (6)メカ車、時計、アクセサリー等の金属類、化粧の衣類、プラスチック類、紙や家具などの他、織物等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7)本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品内容のご相談窓口 株式会社 富士薬品 (学術室)
電 話 (043)648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)