

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読むよう大切に保管してください。

第2類医薬品

つらい痛みをジカにとる (冷感)鎮痛消炎シップ第

サロンシップ・インドメタジンEX

インドメタジン0.5%配合

6枚入

SIZE: 10cm×14cm

内容の特長

1. インドメタジン配合で優れた鎮痛消炎効果

肩や関節などのつらい痛みの元に直接作用する「インドメタジン」がジカと透過し、優れた鎮痛消炎効果を発揮します。

2. 保護チャック付き

中袋には、保護に便利な保護チャックがついて、シップ剤の乾燥を防ぎます。

△△(使用上の注意)

⊗ 注意してください

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤による過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 顔面、かぶれ、傷口。
- (3) あざむいたおし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

● 留意すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この内袋を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

副作用名	表 現
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、ほれ、しりにり感、腫脹、乾癬等

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】関節痛、関節炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 本剤は、痛みやほれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやほれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(2) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(3) 皮膚の弱い人は、貼用前に患部の内側のぬるぬるの部分を綿で拭き、1～2cm角の小片を目安として半日以上乾かし、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】 膏体100g中インドメタジン……0.5g

成分として、エタノール、トリス(塩化)メチル、トリス(塩化)ブチル、カプリル、カルボキシステイリルポリアクリル、カルボキシステイリルセロース、グリセリン、ケイ素アルミナ、糊状チタン、フェノール、ポリ(アクリル酸)重合体、安息香酸、ポリ(エチレン)グリコール、ポリ(ビニルアルコール) (濃化けん化剤)を含有します。

Ⓢ 保存及びお取り扱いの注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所で、おおよそ10年以内の保存してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(開封の原因になったり品質が変わります。)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のチャックを閉めるか又は開口部をテープで封じて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

製造番号

▼ 本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の会社「お客様相談室」までお願いいたします。

販売元  久光製薬株式会社 〒164-0027 東京都杉並区大宮4-2-8

久光製薬お客様相談室 〒100-8221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎ 0120-133250 受付時間: 9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、夜は受付不可)

製造販売元 東光薬品工業株式会社 〒123-0855 東京都江東区新島2-18-23

使用期限



570647