

清涼・鎮痛・バップ剤 生薬成分が配合

サンボープラスター-A 5

第3類医薬品

1枚×10g
5枚入 (14cm×10cm)



使用上の注意

※ 以下の注意を必ず読んでください

(1) 等しいと書かれた症状が悪化したか、副作用が起ころうとする。

1. 次の場合には使用しないてください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) しみ、かぶれ、傷口。



初貼すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、ほれ

- (2) 5～8日間使用しても症状がよくならない場合。

成分・含量

厚紙100cm²

オウバク末	5.0g	フェントール	0.5g
ジフェニヒドラミン	0.05g	α-カンフル	0.3g
サリチル酸メチル	0.5g		

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、デヒドロ酢酸Na、酸化チタン、カオリン、リン酸水素Ca、CaHCO₃、グリセリン、D-ソルビトール、クイナ酸アルミニウム、ポリアクリル酸成分中吸着、ポリビニルアルコール（部分けん化型）、ポリオキシエチレンセチルエーテル

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に認めるよう大切に保管してください。

特 長

サンボープラスター-Aは有効成分（フェントール、α-カンフル、サリチル酸メチル等）の消炎鎮痛効果と同時に薬剤中の多量の油が極力皮膚に作用して、患部の浮腫・炎症・疼痛に、より強い鎮痛効果を発揮します。
さらにサンボープラスター-Aには、消炎作用のある生薬成分オウバク末が配合されています。

効能・効果

頭痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、歯牙痛

用法・用量

貼付1～2回（患部に貼付する）。

（用法・用量に留意すること）

定められた用法をお守りください。

小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとで使用させてください。

本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

薬剤師のフィロムを証しし、そのまま患部に貼付し、患部で止めるが指導を受けてください。
汗をかいているときは、よくみわとってからお貼ください。

患部の広さに応じて、フィロムの上から適量な大きさにハサミで切ってご使用ください。

収容及び保管上の事項

(1) 直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

(2) 子供の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の薬剤が入り混じらないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、密封口のチェックをきちんとし、保管してください。

(5) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

【お問い合わせ先】

本薬について、お問い合わせの連絡先については、お申し込みの用紙または下記までご連絡ください。
（お問い合わせ先）
三宝製薬株式会社
電話 03-3902-0100
FAX 03-3902-1100（営業時間内）

【副作用等報告連絡先（医師、薬剤師）】

（問い合わせ先）
三寶製薬株式会社
<http://www.sanpo-pharm.co.jp/sanpo-pharm.html>
電話 0120-148-9211（フリーダイヤル）

※ 特効薬 本薬の使用後に痛みがとれず、十分な鎮痛効果を得られず、必要に応じて他の薬品に併用することにより、副作用やアレルギー反応があらわれることがあります。このような場合には使用を中止し、医師の指導に従ってください。



三寶製薬株式会社
東京都中央区本町2-1-1



三寶製薬株式会社
東京都中央区本町2-1-1

製造
番号

使用
期限



4 961248 002798

0

0101