

【効能・効果】

- 筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛
- 関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）
- 打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞


- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 11歳未満の小児には使用させないでください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 1週間当たり50mLを超えて使用しないでください。(6) 薬剤塗布後の患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。(7) 定められた用法・用量をお守りください。

※使用の際は薬液をスポンジに十分浸透させてから塗布してください。(スポンジが乾いたまま塗布しますとスポンジが破れるおそれがあります)

筋肉・関節の痛みをとる

ボランテ液 1%

経皮吸収型鎮痛消炎剤



100mL

第2類医薬品

【成分・分量】 100g中

インドメタシン…1,000mg

l-メントール…3,000mg

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、イソプロパノール、エデト酸Na水和物、オキシベンゾン、ミリスチン酸イソプロピル、ベンジルアルコール、ヒドロキシプロピルセルロース、グリセリン、チオ硫酸Na水和物、1,3-ブチレングリコール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手とどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。(5) 火気に近づけないでください。(6) 使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。



発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

<http://www.nippon-yakuhin.jp>

◆お問い合わせ先◆

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

03-3370-7174(代表)

月・金曜日

9:00～17:00(祝祭日を除く)



製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

ここから
開けてください

第2類
医薬品

販売名 ボランテ液 1%

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本人によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931



製造番号

使用期限