

●機能・効果●

かゆみ、虫さされ

●用法・用量●

1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください
- (4) 定められた用法・用量を守つてください

●成分・分量●

100mL中
ジフェンヒドラミン塩酸塩 … 2.0g
リドカイン ……………… 0.5g
 ϑ -メントール ……………… 3.0g
 α -カンフル ……………… 2.0g
添加物: クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、ハーセチルレショ糖、アンモニア

製造番号

使用期限

鎮痒消炎剤

ピナ[®] クール液

2つのかゆみ止め成分配合

虫さされ・かゆみ

ジフェンヒドラミン塩酸塩が
ヒスタミンの活性を
ブロック!!

リドカインが
かゆみの伝達を
ストップ!!

ϑ -メントール
配合でクールな
塗りごこち!!

50mL 本品は、ステロイドを
使用しておりません



第2類医薬品

●保管及び取り扱い上の注意●

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れかねないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 火気には近づけないでください
- (5) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください
- (6) 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください

*ヒスタミンとはかゆみの原因物質のことです。

ここから
開けてください

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

1 ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみの元となるヒスタミンの働きを抑えます

2 リドカインの局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます

3 ϑ -メントール配合でクールで爽快な塗りごこち

⚠【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

販売名 ピナクール液

第2類医薬品

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

