

肩こり | 腰痛 | 筋肉痛 湿布

ご使用に際して、この説明文書も必ずお読みください。
また、必要な時に貼めるように大切に保管してください。

第3類
医薬品

新ラグパスト 7枚入
1枚 14cm X 10cm
消炎・鎮痛温感バップ剤

◆◆◆特徴◆◆◆

新ラグパストはサリチル酸メチル、α-カンフルによる消炎鎮痛効果と、トウガラシエキスの配合による温感効果をお互に合わせ、慢性的な腰痛、肩こり等に優れた効果を発揮します。

▲使用上の注意

❌ **貼ってはいけないこと** (内傷など他の病状が重なり、貼付が妨げられることがあります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。
(2)しっしん、かぶれ、傷口。



貼付するとき

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発赤・発疹、かゆみ、はれ、痛み

(2)5～6日間使用しても症状がよくなる見込み。

■用法用量

本剤の使用中に痛みをとまらぬ症状を再びた米程大の赤みがあらわれた場合には、ウイルスによる感染症であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止し、必ず科専門医の診察を受けてください。



製造番号

使用期限

◆◆◆効能・効果◆◆◆

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨節痛

◆◆◆用法・用量◆◆◆

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

＜用法・用量に配慮する注意＞

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)痒みがかいている時は、よくあさってから貼り直してください。
- (5)薬局の店さにおいて、フィルムの上から適度な大きさにハサミで切ってご使用ください。
- (6)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (7)入浴の30分以上前にははがしてください。

◆◆◆成分・分量◆◆◆100cm² (厚み100g) 中 ◆◆◆

サリチル酸メチル	1.0g
α-カンフル	0.5g
トウガラシエキス	0.05g*
基剤	ポリニルアルコール(重合分分子量)、カルボキシニルポリマー、ポリジアリルセレン酸中核体、DMC-MH、D-ソルビトール、グリセリン、セスキオレイン酸ナトリウム、ポリニルベート80、キヤリアミン、カオリン、酸化チタン、エタノール、パラベン

◆◆◆保管及び取扱い上の注意◆◆◆

- (1)小児の手が届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3)他の容器に入力入れないでください。(湿気の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のフタスナーをきちんと閉めて外気にふれないように保管してください。
- (5)使用期限過ぎた製品は使用しないでください。

＜お問い合わせ先＞

本製品に関するお問い合わせは、下記まで
ご連絡ください。お問い合わせ、申し込みは、
東京薬品工業株式会社 電話 03-5953-0101

＜販売店検索サービスのご案内（お問い合わせ先）＞

【販 売 店 検索サービス】
<http://www.mitsui.co.jp/ir/ku/hisagi.html>
電話 0120-149-921（フリーダイヤル）



東京薬品工業株式会社
東京都中央区銀座1丁目1番1号



東京薬品工業株式会社
東京都中央区銀座2丁目1番1号