

●ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください●

消炎・鎮痛 温感バップ剤

ラクールH

第3類医薬品

特 徴

ラクールHはサリチル酸メチル、α-カンフルによる消炎鎮痛効果と、トウガラシエキスの配合による温感効果を合わせもち、慢性的な腰痛、肩こり等に優れた効果を発揮します。また、伸縮性不織布を使用していますので、関節部や筋肉の動きにびったりフィットし、ヒジ、ヒザなどのはがれやすい部位にも効果的です。



使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) しっしん、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、ほれ、痛み

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

打撲、捻挫、骨折痛、肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛

用法・用量

患部のフィルムをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 定められた用法・用量をお守りください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4) 汗をかいている時は、よくふきとってから貼りください。(5) 患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。(6) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(7) 入浴の30分以上前にははがしてください。

成分・分量 膏体100g中

成分	分量
サリチル酸メチル	1.0g
α-カンフル	0.5g
トウガラシエキス・20	0.025g*

添加物として、ポリソルベート80、パラベン、デヒドロ酢酸Na、赤色102号、香料、中鎖脂肪酸トリグリセリド、酸化チタン、ヒプロメロース、リン酸水素Ca、グリセリン、D-ソルビトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、ポリアクリル酸Na、カルボキシビニルポリマーを含有します。

*原生薬換算量1.25g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 一度開封した袋は口を二重に折りあげて外気にふれないようにしてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先

<電話> 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発 売 元



ラクール薬品販売株式会社

東京都足立区蓮沼1丁目9番14号
お問い合わせ先 番03-3853-7611

製造販売元



東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

製造番号

使用期限

口