

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

第2類医薬品

虫さされ・かぶれ・じんましん等のかゆみに

鎮痒消炎薬

カユドメリン[®]ガード

製品の特徴

カユドメリン ガードは、

- ◆虫さされ、かぶれ、じんましん、皮膚炎、湿疹、あせも等による“かゆみ”を素早くしずめます。
- ◆患部の赤み・はれをおさえる成分により、炎症に伴う“かゆみ”を緩和します。
- ◆かき傷の細菌感染による症状の悪化をおさえます。
- ◆目立たない透明ゲル剤で、塗布面に薄い皮膜をつくります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

虫さされ、かゆみ、かぶれ、じんましん、皮膚炎、湿疹、あせも、ただれ、しもやけ

用法・用量

1 日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分とはたらき

成 分	分量 (100g中)	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの原因物質をブロックします。
リドカイン	2.0g	患部への麻酔作用により、かゆみを速やかにおさえます。
グリチルレチン酸	1.0g	抗炎症作用により、患部の赤み・はれをおさえます。
クロタミトン	6.0g	かゆみをおさえます。
l-メントール	4.0g	清涼感により、かゆみをしずめます。
d-l-カンフル	2.0g	穏やかな麻酔作用と清涼感により、かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.2g	殺菌消毒作用により、患部の悪化(細菌感染)を防ぎます。

添加物として、エタノール、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロースを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (6) 本剤は浸透性の基剤を用いているため、次のことに注意してください。
 - ・メガネ、プラスチック類、家具類、床(フローリング等)、皮革製品、衣類等に付着すると変質、変色することがあります。
 - ・プラスチック製品を軟化したり、塗料・インクを溶かすことがあります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●ワンポイント情報

虫さされやじんましんなどによって患部にかゆみを生じた場合には、患部をかきむしらないでください。かきむしると皮膚を傷つけ、細菌感染などを起こしたり、症状が悪化したり、あとが残ることがあります。早めにかゆみ止め薬を塗り、かゆみや炎症をおさえてください。もし、薬が手元にない場合には、氷を当てたり冷水に浸すなどの応急処置をしておくと、かゆみやはれをやわらげることができます。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎ 03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

東興薬品工業株式会社

富山県中新川郡立山町辻20