

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

エセブロンE

酢酸d δ - α -トコフェロール軟カプセル

中年をすぎると私達の体力は衰え老化の訪れを感じようになります。肩がこる・首すじがこる・のぼせなどの症状が起ります。また手足の冷えやしびれ、しもやけに悩みます。エセブロンEはこれらの症状や血行障害をやわらげ、過酸化脂質の増加を防止します。

〔ビタミンEの薬理作用〕

●血行をよくする作用

中年以後は血管や心臓などの循環系統の働きが衰え、また末梢血管の血行不良のため、手足の冷えやしびれの原因になります。ビタミンEは血行をよくして、これらの症状を改善します。

●更年期症状の緩和

肩のこり、手足や腰の冷えやしびれ、のぼせなどの症状は内分泌の退行からと言われます。ビタミンEはこれらの症状を緩和します。



〔使用上の注意〕



相談すること

1.次の人は、服用前に医師または薬剤師に相談してください

医師の治療を受けている人。

2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3.生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。

出血が長く続く場合は、医師または薬剤師に相談してください

4.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強がみられた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください
便秘、下痢

〔効能・効果〕

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給
老年期

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回（朝、昼、晩）服用してください。

年 齢	大人（15歳以上）	（15歳未満）
1 回 量	1カプセル	服用しないこと

〔成分・分量〕 1日量（3カプセル）中

酢酸トコフェロール（ビタミンE）……………300mg

添加物として、オリブ油、ゼラチン、D-ソルビトール、グリセリン、パラベンを含有しています。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)配置期限をすぎた製品は服用しないでください。

〔包 装〕

120カプセル

消費者相談窓口

生晃栄養薬品株式会社
大阪市西淀川区姫里2丁目3番28号
くすり相談室TEL06-6473-1623



内外薬品株式会社
富山市三番町3-10

製造販売元 生晃栄養薬品株式会社
大阪市西淀川区姫里2丁目3番28号