

東洋漢方のセンナ顆粒S(分包)

第②類医薬品

本剤は、古くから生薬の緩下剤として使用されているセンナを主薬とする顆粒剤です。
センナは大腸を直接刺激して、その蠕動を促進させ、便秘及び便秘に伴う腹部膨満、食欲不振、頭重、のぼせ等の不快な症状の軽快にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
 3. 大量に服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2)1週間位服用しても症状がよくなりません

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

[効能・効果]

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

[用法・用量]

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1/2～1包	2回	11才未満7才以上	1/4～1/2包	2回
15才未満11才以上	1/3～2/3包		7才未満	服用しないこと	

上記の量を朝夕の空腹時に服用して下さい。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量すること。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1日量2包(1包1.4g)中]

日本薬局方 センナ末……………1.00g
添加物として、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、結晶セルロース、部分アルファ化デンプン、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5)本剤は生薬を原料とした製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 06-6211-4976

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931



製造販売元
東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号