

東洋の葛根湯エキス顆粒S

(かっこんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に収載されている葛根湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| (1)医師の治療を受けている人。 | (6)高齢者。 |
| (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 |
| (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。 | (8)次の症状のある人。：むくみ、排尿困難 |
| (4)胃腸の弱い人。 | (9)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 |
| (5)発汗傾向の著しい人。 | |

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 1カ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1.50 g	3 回	7才未満4才以上	0.75 g	3 回
15才未満7才以上	1.00 g		4才未満2才以上	0.50 g	
			2才未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
(2)用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量4.5g中]

日本薬局方	カ	ツ	コ	ン	2.0 g	日本薬局方	シ	ャ	ク	ヤ	ク	1.0 g			
日本薬局方	マ	オ	ウ		1.5 g	日本薬局方	カ	ン	ソ	ウ		1.0 g			
日本薬局方	タ	イ	ソ	ウ		1.5 g	日本薬局方	シ	ョ	ウ	キ	ョ	ウ		0.5 g
日本薬局方	ケ	イ	ヒ		1.0 g	より製した水製乾燥エキス								1.80 g	

添加物として、乳糖・メタケイ酸アルミン酸Mg・ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと。
(4)本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。
(5)本剤は、吸湿しやすいので、服用後は、フタを固くしめる等密閉して保管してください。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 06-6211-4976

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府豊田市中野町東2丁目1番16号