

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

東洋の加味帰脾湯エキス顆粒

(かみきひとつ)

第2類医薬品

本剤は、中国宗時代の古典「済生全書」に収載されている加味帰脾湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。：むくみ
(6)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2)1ヵ月位服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- 3.長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：貧血、不眠症、精神不安、神経症

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2.0g	3回	7才未満4才以上	1.0g	3回
15才未満7才以上	1.3g		4才未満2才以上	0.7g	

【用法及び用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 [本品1日量6.0g中]

ニ ン ジ ン	1.5g	オ ン シ	0.5g
ビ ャ ク ジ ュ ツ	1.5g	サ イ コ	1.5g
ブ ク リ ョ ウ	1.5g	サ ン シ	1.0g
サンソウニン	1.5g	カ ン シ	0.5g
リュウガンニク	1.5g	モ ツ コ	0.5g
オ ウ キ	1.0g	タ イ ソ	0.5g
ト ウ キ	1.0g	ショウキョウ	0.15g
		より製した水製乾燥エキス	2.2g
		添加物として、乳糖・バレイショデンプンを含む。	

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 本剤は生薬を原料としたエキスをを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

製造販売元

 **東洋漢方製薬株式会社**
大阪府富田林市中野町東2-1-16

 **0120-00-1040**

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)