

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の加味帰脾湯エキス顆粒

(かみきひとつ)

第2類医薬品

本剤は、中国宗時代の古典「済生全書」に収載されている加味帰脾湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。：むくみ
 - 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 三 オ パ チ ー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：貧血、不眠症、精神不安、神経症

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数	年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	2.0 g	3 回	7才未満 4才以上	1.0 g	3 回
15才未満 7才以上	1.3 g		4才未満 2才以上	0.7 g	
			2才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品 1日量6.0g中]

日本薬局方	ニ ッ シ ャ	1.5 g
日本薬局方	ビ ャ ク シ ャ	1.5 g
日本薬局方	フ ク リ ョ ン	1.5 g
日本薬局方	サ ン ソ ン	1.5 g
日本薬局方	リ ユ ウ ガ ン	1.5 g
日本薬局方	オ ウ	1.0 g
日本薬局方	ト ウ	1.0 g

日本薬局方	オ	シ	0.5 g
日本薬局方	イ	コ	1.5 g
日本薬局方	サ	シ	1.0 g
日本薬局方	ン	ソ	0.5 g
日本薬局方	カ	ウ	0.5 g
日本薬局方	モ	ウ	0.5 g
日本薬局方	タ	ウ	0.5 g
日本薬局方	シ	ウ	0.15 g
より製した水製乾燥エキス			2.2 g
添加物として、乳糖・バレイショデンプンを含有する。			

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4)本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号