

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の加味帰脾湯エキス顆粒

(かみきひとう)

第2類医薬品

本剤は、中国宗時代の古典「済生全書」に収載されている加味帰脾湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ
 - (5) 次の症状のある人。：むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミ オ パ チ ー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：貧血、不眠症、精神不安、神経症

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、500g入り包装の場合は、服用時添付のサシ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包または2.0g	3回	7才未満4才以上	1/2包または1.0g	3回
15才未満7才以上	2/3包または1.3g		4才未満2才以上	1/3包または0.7g	
			2才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉


- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
(2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量6.0g又は3包(1包2.0g)中]

日本薬局方 ニ ン シ ン	1.5g	日本薬局方 オ ン シ	0.5g
日本薬局方 ビ ャ ク シ ュ ツ	1.5g	日本薬局方 サ イ コ	1.5g
日本薬局方 ブ ク リ ョ ウ	1.5g	日本薬局方 サ ン シ シ	1.0g
日本薬局方 サ ン ソ ウ ニ	1.5g	日本薬局方 カ ン ソ ウ	0.5g
日本薬局方 リ ュ ウ ガ ン ニ	1.5g	日本薬局方 モ ッ コ	0.5g
日本薬局方 オ ウ ギ	1.0g	日本薬局方 タ イ ソ	0.5g
日本薬局方 ト ウ キ	1.0g	日本薬局方 シ ョ ウ キ ョ ウ	0.15g
		より製した水製乾燥エキス	2.2g
		添加物として、乳糖・バレイショデンプンを含有する。	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
(4) 1包を分割した残りを用いる場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
(5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0120-00-1040
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号