

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の桔梗湯エキス顆粒S

(ききょうとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に記載されている桔梗湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 次の症状のある人。：むくみ
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

【用法・用量】

年 齢	1 回量	1 日服用回数	年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	1 包	3 回	7才未満 4才以上	1/2 包	3 回
15才未満 7才以上	2/3 包		4才未満 2才以上	1/3 包	
			2才未満	服用しないこと	

上記の量を、食前又は食間に少しづつ口中に含み、水又は白湯で徐々に溶かして服用して下さい。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品 1 日量 3 包 (1 包 1.5 g) 中]

日本薬局方 キ キ ヨ ウ ……2.0 g

日本薬局方 カ ン ソ ウ ……3.0 g
より製した水製乾燥エキス ……1.25 g

添加物として、乳糖、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2 日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 06-6211-4976

受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田市中野町東2丁目1番16号