

添加物表示

2002年 6月

薬事法改正に伴う改訂

2005年5月

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。

また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

東洋漢方の 駆風解毒湯 エキス顆粒

第2類医薬品

(くふうげどくとう)

本剤は、中国の明時代の古典「万病回春」に収載されている駆風解毒散(湯)に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



相談すること — 使用上の注意 —

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (7) 次の症状のある人。：むくみ |
| (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) | (8) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病 |
| (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。 | |
| (5) 高齢者。 | |

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	皮 膚	消 化 器
症 状	発疹・発赤、かゆみ	食欲不振、胃部不快感等

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 本剤を5～6回服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

尚、本処方は含嗽しながらゆっくりのむのを特徴とする。(少しずつゆっくりのむ)

【用法・用量】

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

なお、用時添付のサジ(すり切り1.0g)を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3.0g	3 回	7才未満4才以上	1.5g	3 回
15才未満7才以上	2.0g		4才未満2才以上	1.0g	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。 (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 本剤は含嗽しながらゆっくりのむこと。

【成分・分量】 [本品1日量9.0g中]

ハマボウフウ.....	3.0g	キョウカツ.....	1.5g
ゴボウシ.....	3.0g	カンゾウ.....	1.5g
レンギョウ.....	5.0g	キキョウ.....	3.0g
ケイガイ.....	1.5g	セッコウ.....	5.0g
より製した水製乾燥エキス.....3.48g			
添加物として乳糖、バレイショデンプンを含有する。			

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

【問い合わせ先】

東洋漢方製薬株式会社 フリーダイヤル 0120-00-1040

受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16