＊：2001年12月改訂
薬事法改正に伴う改訂
2005年９月

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

桂枝茯苓湯（顆粒）
（けいしぶくりょうとう）

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に収載されている桂枝茯苓丸に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
＊肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2)１カ月位服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

下痢

[効能・効果]

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ。

[用法・用量]

下記の量を通常食前又は空腹時に白湯にて服用して下さい。

年齢	１回量	１日服用回数	年齢	１回量	１日服用回数
大人（15才以上）	１包	３回	15才未満７才以上	２／３包	３回

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守すること。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

[成分・分量]

[本品１日量３包（１包1.5ｇ）中]

日本薬局方 ケイヒ	1.4ｇ
日本薬局方 ブクリョウ	1.4ｇ
日本薬局方 ボタンピ	1.4ｇ
日本薬局方 シャクヤク	1.4ｇ
日本薬局方 トウニン	1.4ｇ
より製した水製乾燥エキス	0.5ｇ

日本薬局方 ケイヒ末	0.8ｇ
日本薬局方 ブクリョウ末	0.8ｇ
日本薬局方 ボタンピ末	0.8ｇ
日本薬局方 シャクヤク末	0.8ｇ
日本薬局方 トウニン	0.8ｇ

保管及び取扱い上の注意

(1)小児の手のとどかない所に保管すること。
(2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
(4)１包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、２日以内に使用すること。
(5)本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
大阪府富田林市中野町東2-1-16
0120-00-1040
受付時間 10:00～17：00（土、日、祝日を除く）