

新 様 式
2001年12月
薬事法改正に伴う改訂
2005年5月

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

東洋の香 蘇 散 料エキス顆粒 第2類医薬品

(こうそさんりょう)

本剤は、中国の宋時代(約1000年前)の古典「太平惠民和剂局方」に収載されている香蘇散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



してはいけないこと



－ 使用上の注意 －

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (5) 次の症状のある人。：むくみ |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病 |
| (3) 高齢者。 | |
| (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 | |

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、 手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

なお、用時添付のサジ(すり切り1.0g)を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1. 50 g	3 回	7才未満4才以上	0. 75 g	3 回
15才未満7才以上	1. 00 g		4才未満2才以上	0. 50 g	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】

[本品1日量4. 5g中]

日本薬局方	コ ウ ブ シ ……	1. 05 g	日本薬局方	コ ウ ブ シ 末 ……	1. 4 g
日本薬局方	ソ ヨ ウ ……	0. 45 g	別紙規格	ソ ヨ ウ 末 ……	0. 6 g
日本薬局方	チ ン ピ ……	0. 90 g	別紙規格	チ ン ピ 末 ……	1. 2 g
日本薬局方	カ ン ゾ ウ ……	0. 30 g	日本薬局方	カ ン ゾ ウ 末 ……	0. 4 g
日本薬局方	ショウキョウ ……	0. 30 g	日本薬局方	ショウキョウ末 ……	0. 4 g
より製した水製乾燥エキス ……		0. 5 g			

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
(2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
(4) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

【問い合わせ先】

東洋漢方製薬株式会社 フリーダイヤル 0120-00-1040
受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **東洋漢方製薬株式会社**

大阪府富田林市中野町東2-1-16