

東洋の五苓散料エキス顆粒(分包)

(ごれいさんりょう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に記載されている五苓散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1 カ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：
水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ

＜効能又は効果に関連する注意＞

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【用法・用量】

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数	年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	1 包	3 回	7 才未満 4 才以上	1 / 2 包	3 回
15才未満 7 才以上	2 / 3 包		4 才未満	服用しないこと	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品 1 日量 3 包(1 包 1.5 g) 中]

日本薬局方	タ ク シ ャ	2.0 g
日本薬局方	チ ョ レ イ	1.5 g
日本薬局方	ブ ク リ ョ ウ	1.5 g
日本薬局方	ビ ャ ク ジ ャ ッ	1.5 g
日本薬局方	ケ イ ヒ	1.0 g
より製した水製乾燥エキス		1.05 g

日本薬局方	タ ク シ ャ 末	0.60 g
別 紙 規 格	チ ョ レ イ 末	0.45 g
日本薬局方	ブ ク リ ョ ウ 末	0.45 g
日本薬局方	ビ ャ ク ジ ャ ッ 末	0.45 g
日本薬局方	ケ イ ヒ 末	0.30 g
添加物として、部分アルファー化デンプン含有する。		

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2 日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 06-6211-4976

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号