

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒

(さいこけいしかんきょうとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」に記載されている柴胡桂枝乾姜湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。：むくみ
 - (6)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミ オ バ チ ー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症：
更年期障害、血の道症、不眠症、神経症

〈効能・効果に関連する注意〉

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちななどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数	年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15才以上)	1.50 g	3 回	7才未満 4才以上	0.75 g	3 回
15才未満 7才以上	1.00 g		4才未満 2才以上	0.50 g	
			2才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量4.5g中]

日本薬局方	サ	イ	コ	3.0 g	日本薬局方	ボ	レ	イ	1.5 g
日本薬局方	ケ	イ	ヒ	1.5 g	日本薬局方	カン	キョ	ウ	1.0 g
日本薬局方	カ	ロ	コ	1.5 g	日本薬局方	カン	ソ	ウ	1.0 g
日本薬局方	オ	ウ	ゴ	1.5 g	より製した水製乾燥エキス				
					添加物として、乳糖、パレイショデンプンを含有する。				

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4)本剤は生薬を原料としたエキスを他の製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号