

東洋漢方の十味敗毒湯エキス顆粒

(じゅうみはいどくとう)

第2類医薬品

本剤は、華岡青洲先生の創方による十味敗毒湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今まで薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人：むくみ
- (8) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、まれに症状が進行した場合。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1カ月位（化膿性皮膚疾患、急性皮膚疾患の初期、急性湿疹に服用する場合には1週間位）服用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

3. 長期運用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、この場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫

【用法・用量】

下記の量を食間に水又は温湯にて服用して下さい。

なお、用時添付のサジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2.0g	3回	7才未満4才以上	1.0g	3回
15才未満7才以上	1.3g		4才未満2才以上	0.7g	

（用法及び用量に関連する注意）

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。

- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 [本品1日量6.0g中]

サ イ コ	0.996g
オ ウ ヒ	0.996g
キ キ ヨ	0.996g
セン キ ユ	0.996g
ブ ク リ ヨ	1.328g
ド ク カ ツ	0.996g
ハ マ ボ ウ フ	0.996g
カン ソ ウ	0.332g
カン キ ヨ	0.332g
ケ イ ガ イ	0.332g
より製した水製乾燥エキス	2.00g

サ イ コ 末	0.48g
オ ウ ヒ 末	0.48g
キ キ ヨ 末	0.48g
セン キ ユ 末	0.48g
ブ ク リ ヨ 末	0.64g
ド ク カ ツ 末	0.48g
ハ マ ボ ウ フ 末	0.48g
カン ソ ウ 末	0.16g
カン キ ヨ 末	0.16g
ケ イ ガ イ 末	0.16g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16

 0120-00-1040

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)