

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋漢方の 十味敗毒湯エキス顆粒

(じゅうみはいどくとう)

第2類医薬品

本剤は、華岡青洲先生の創方による十味敗毒湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 2. 1ヵ月位 (化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位) 服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫

[用法・用量]

下記の量を食前に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサジ (すり切り1.0g) を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人 (15才以上)	2.0 g	3 回	7才未満 4才以上	1.0 g	3 回
15才未満 7才以上	1.3 g		4才未満 2才以上	0.7 g	
			2才未満	0.5 g 以下	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1日量6.0g中]

日本薬局方	サ	イ	コ	0.996 g	別紙規格	サイ	コ	末	0.48 g					
日本薬局方	オ	ウ	ヒ	0.996 g	別紙規格	オ	ウ	ヒ	末	0.48 g				
日本薬局方	キ	キ	ヨ	0.996 g	日本薬局方	キ	キ	ヨ	末	0.48 g				
日本薬局方	セ	ン	キ	ヨ	0.996 g	日本薬局方	セ	ン	キ	ヨ	末	0.48 g		
日本薬局方	ブ	ク	リ	ヨ	1.328 g	日本薬局方	ブ	ク	リ	ヨ	末	0.64 g		
日本薬局方	ド	ク	カ	ツ	0.996 g	別紙規格	ド	ク	カ	ツ	末	0.48 g		
日本薬局方	ハ	マ	ボ	ウ	フ	0.996 g	別紙規格	ハ	マ	ボ	ウ	フ	末	0.48 g
日本薬局方	カ	ン	ゾ	ウ	0.332 g	日本薬局方	カ	ン	ゾ	ウ	末	0.16 g		
日本薬局方	カ	ン	キ	ヨ	ウ	0.332 g	別紙規格	カ	ン	キ	ヨ	ウ	末	0.16 g
日本薬局方	ケ	イ	ガ	イ	0.332 g	局外生規	ケ	イ	ガ	イ	末	0.16 g		
より製した水製乾燥エキス					2.00 g									

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 本剤は生薬を原料としたエキスをういた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0120-00-1040
受付時間 9:00~17:00 (土・日・お盆・年末年始)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931