

※：2002年2月改訂

添加物表示

2002年10月

薬事法改正に伴う改訂

2005年5月

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。

また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

東洋の辛夷清肺湯エキス顆粒

(しんいせいはいとう)

第2類医薬品

本剤は、中国の明時代の古典「外科政宗」に記載されている辛夷清肺湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



相談すること



－使用上の注意－

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。 (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (4) 胃腸虚弱で冷え症の人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

【効能・効果】

鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症

【用法・用量】

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

なお、用時添付のサジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数	年齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	3.0g	3回	7才未満4才以上	1.5g	3回
15才未満7才以上	2.0g		4才未満2才以上	1.0g	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 [本品1日量9.0g中]

シンイ	2.0g	バクモンドウ	5.0g
チモ	3.0g	セッコウ	5.0g
ジャクゴウ	3.0g	ショウマ	1.0g
オウゴン	3.0g	ビワヨウ	2.0g
サンシシ	3.0g	より製した水製乾燥エキス	3.44g

添加物として乳糖、バレイショデンプンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
(2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
(4) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

【問い合わせ先】

東洋漢方製薬株式会社 フリーダイヤル 0120-00-1040

受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16