

東洋の人参湯エキス顆粒

(にんじんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に収載されている人参湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。：むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1カ月位（嘔吐・下痢に服用する場合には1週間位）服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

手足などが冷え易く、尿量が多いものの次の諸症：胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛

【用法・用量】

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

なお、服用時添付サジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1.5 g	3回	7才未満 4才以上	0.75 g	3回
15才未満 7才以上	1.0 g		4才未満 2才以上	0.5 g	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 [本品1日量4.5g中]

ニ ン ジ ン	1.5 g	ニ ン ジ ン 末	0.75 g
カ ン ソ ウ	1.5 g	カ ン ソ ウ 末	0.75 g
ビャクジュツ	1.5 g	ビャクジュツ末	0.75 g
カ ン キ ョ ウ	1.5 g	カ ン キ ョ ウ 末	0.75 g
より製した水製乾燥エキス	1.04 g	添加物として、乳糖・パレイショデンプンを含む。	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16

 0120-00-1040

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)