

東洋の人参湯エキス顆粒(分包)

(にんじんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に記載されている人参湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。：むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1カ月位(急性胃炎に服用する場合には5～6回、下痢、嘔吐に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

手足などが冷え易く、尿量が多いものの次の諸症：胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛

【用法・用量】

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	7才未満4才以上	1/2包	3回
15才未満7才以上	2/3包		4才未満2才以上	1/3包	
			2才未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】〔本品1日量3包(1包1.5g)中〕

日本薬局方 ニンジン	1.5g	日本薬局方 ニンジン末	0.75g
日本薬局方 カンソウ	1.5g	日本薬局方 カンソウ末	0.75g
日本薬局方 バクジュツ	1.5g	日本薬局方 バクジュツ末	0.75g
日本薬局方 カンキョウ	1.5g	別紙規格 カンキョウ末	0.75g
より製した水製乾燥エキス	1.04g	添加物として、乳糖・パレイショデンプンを含有する。	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 06-6211-4976

受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府豊田林市由野町2丁目1番16号