

※:2003年 2月改訂

薬事法改正に伴う改訂
2005年 5月

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

東洋漢方の麦門冬湯

第2類医薬品

(ばくもんどうとう)

10包入

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に収載されている麦門冬湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水様性の痰の多い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。：むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
*肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 1ヵ月位(痰のきれにくい咳に服用する場合には1週間位)服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

3. 長期運用する場合は、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

痰のきれにくい咳、気管支炎、気管支ぜんそく。

【用法・用量】

1包(1日量)を和紙袋入りのまま、水500mLを加え、半量位まで煎じつめ、和紙袋とともに煎じがすを除き、食前に温服して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数
大人(15才以上)	全 量	3回に分けて	7才未満4才以上	1/2量	3回に分けて
15才未満7才以上	2/3量		4才未満2才以上	1/3量	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法：用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 [本品1包(1日量) 27.0g 中]

日本薬局方	バクモンドウ	10.0g	日本薬局方	タ イ ソ ウ	3.0g
日本薬局方	ハ ン ゲ	5.0g	日本薬局方	ニ ン シ ン	2.0g
別 紙 規 格	コ ウ ベ イ	5.0g	日本薬局方	カ ン ソ ウ	2.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田市中野町東2-1-16

 0120-00-1040

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)