

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

東洋の半夏瀉心湯エキス顆粒

(はんげしゃしんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」に収載されている半夏瀉心湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。：むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
*肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 1カ月位(急性胃腸カタル、二日酔、げっぷ、胸やけに服用する場合には、5～6回)服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
3. 長期運用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

みぞおちがつつかえ、時に悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

【用法・用量】

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

なお、用時添付のサジ(すり切り1.0g)を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3.0 g	3 回	7才未満4才以上	1.5 g	3 回
15才未満7才以上	2.0 g		4才未満2才以上	1.0 g	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 [本品1日量9.0g中]

日本薬局方 ハ ン ゲ	5.0 g	日本薬局方 カ ン ソ ウ	2.5 g
日本薬局方 オ ウ ゴ ン	2.5 g	日本薬局方 タ イ ソ ウ	2.5 g
別紙規格 カ ン キ ョ ウ	2.5 g	日本薬局方 オ ウ レ ン	1.0 g
日本薬局方 ニ ン シ ン	2.5 g	より製した水製乾燥エキス	3.44 g

添加物として乳糖、バレイショデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

製造販売元

 東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16

 0120-00-1040

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)