

東洋の半夏瀉心湯エキス顆粒(分包)

(はんげしゃしんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」に収載されている半夏瀉心湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。：むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 1カ月位(急性胃腸炎、二日酔、げっぷ、胸やけに服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合

3. 長期運用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

みぞおちがつかえ、時に悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

【用法・用量】

下記の量を食前又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	7才未満4才以上	1/2包	3回
15才未満7才以上	2/3包		4才未満2才以上	1/3包	
			2才未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量3包(1包3.0g)中]

日本薬局方	ハ	ン	ゲ		5.0g	日本薬局方	カ	ン	ソ	ウ		2.5g	
日本薬局方	オ	ウ	ゴ		2.5g	日本薬局方	タ	イ	ソ	ウ		2.5g	
日本薬局方	カ	ン	キ	ョ		2.5g	日本薬局方	オ	ウ	レ	ン		1.0g
日本薬局方	ニ	ン	ジ	ン		2.5g	より製した水製乾燥エキス						3.44g

添加物として乳糖、パレイシヨデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なる場合がありますが、効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 06-6211-4976

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931