

白虎加人參湯

(びゃっこかにんじんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に収載されている白虎加人參湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| (1)医師の治療を受けている人。 | (5)高齢者。 |
| (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (6)次の症状のある人。：むくみ |
| (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。 | (7)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病 |
| (4)胃腸虚弱で冷え症の人。 | |

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなりません

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

のどの渇きとぼてりのあるもの。

【用法・用量】

1包（1日量）につき水400mLを加えあまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともに煎じかすを取り去り、大人（15才以上）は、食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。小人（15才未満4才以上）は、食間空腹時に温服して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数
大人(15才以上)	全量	3～2回に分けて	7才未満4才以上	1/2量	3回に分けて
15才未満7才以上	2/3量	3回に分けて	4才未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2)用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1包(1日量)35.0g中]

日本薬局方 チ	モ……………5.0g	日本薬局方 ニ シ ン……………3.0g
日本薬局方 セ ッ コ ウ……………15.0g		別 紙 規 格 コ ウ ベ イ……………10.0g
日本薬局方 カ ン ソ ウ……………2.0g		

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
- (4)煎じ薬は腐敗しやすいので、冷蔵所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 06-6211-4976

受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号