

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

東洋の葛根湯加川芎辛夷

第2類医薬品

(かっこんとうかせんきゅうしんい)

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に収載されている葛根湯に川芎と辛夷を加えた煎薬用の紙パック剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4)胃腸の弱い人。
- (5)発汗傾向の著しい人。
- (6)高齢者。
- (7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8)次の症状のある人。：むくみ、排尿困難
- (9)次の診断を受けた人。：
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2)1ヵ月位服用しても症状の改善のみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎

【用法・用量】

大人（15才以上）は1包（1日量）につき水400mLを加えて約半量になるまで煮詰め、紙袋とともに煎じかすを取り去り、煎液を食前又は食間2回に分けて服用して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1 日 服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1 日 服用回数
大人(15才以上)	全 量	2 回に 分けて	4 才未満 2 才以上	1 / 3 量	2 回に 分けて
15才未満 7 才以上	2 / 3 量		2 才未満	1 / 4 量	
7 才未満 4 才以上	1 / 2 量		3 ヶ月未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉


- (1)定められた用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 [本品 1包（1日量） 24.0g 中]

カ ッ コ ン	4.0g	シャクヤク	2.0g	カ ン ソ ウ	2.0g
マ オ ウ	4.0g	タ イ ソ ウ	3.0g	セ ン キ ュ ウ	3.0g
ケ イ ヒ	2.0g	シ ョ ウ キ ョ ウ	1.0g	シ ン イ	3.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4)煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

製造販売元



東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16



0120-00-1040

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)