

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の荊芥連翹湯

(けいがいれんぎょうとう)

第2類医薬品

本剤は、「一貫堂方」に収載されている荊芥連翹湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。 (4)高齢者。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5)次の症状のある人。：むくみ
(3)胃腸が弱く下痢しやすい人。 (6)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

〔用法・用量〕

1包（1日量）につき水400mLを加えて約半量になるまで煮詰め、紙袋とともに煎じかすを取り去り、煎液を食前又は食間に2回～3回に分けて服用して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1 日 服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1 日 服用回数
大人(15才以上)	全 量	2回～3回 に分けて	4才未満 2才以上	1/3量	2回～3回 に分けて
15才未満 7才以上	2/3量		2才未満	1/4量	
7才未満 4才以上	1/2量				

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
(2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させること。
(3)用法・用量を厳守すること。

〔成分・分量〕 [本品1包（1日量）27.0g中]

日本薬局方 トウキ……1.5g	日本薬局方 オウバク……1.5g	日本薬局方 キ シ ツ……1.5g
日本薬局方 シャクヤク……1.5g	日本薬局方 サンシシ……1.5g	日本薬局方 カンソウ……1.5g
日本薬局方 センキュウ……1.5g	日本薬局方 レンギョウ……1.5g	日本薬局方 ビャクシ……2.0g
日本薬局方 シ オウ……1.5g	日本薬局方 ケイガイ……1.5g	日本薬局方 キキョウ……2.0g
日本薬局方 オウレン……1.5g	日本薬局方 ポウフ……1.5g	日本薬局方 サイゴ……2.0g
日本薬局方 オウゴン……1.5g	日本薬局方 ハ ッ カ……1.5g	

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと。
(4)煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



〔問い合わせ先〕

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 06-6211-4976

受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田市中野町東2丁目1番16号