

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の防己黄耆湯エキス顆粒S

(ぼういおうぎとう)

第2類医薬品



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

ひざの痛み又はむくみ。

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数	年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15才以上)	1 包	3 回	7 才 未 満 4 才 以 上	1/2 包	3 回
15才未満 7 才 以 上	2/3 包		4 才 未 満 2 才 以 上	1/3 包	
			2 才 未 満	服 用 し な い こ と	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量3包(1包1.5g)中]

日本薬局方	ボ	ウ	イ		2.50g	日本薬局方	シ	ョ	ウ	キ	ョ	ウ		0.50g
日本薬局方	オ	ウ	ギ		2.50g	日本薬局方	タ	イ	ソ	ウ		1.50g		
日本薬局方	ビ	ャ	ク	ジュ	ツ		1.50g	日本薬局方	カ	ン	ゾ	ウ		0.75g
						より製した水製乾燥エキス								1.6g

添加物として、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、
部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田市中野町東2丁目1番16号