

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋のヨクイニンエキス顆粒S分包

第3類医薬品

本剤は、ハトムギの種皮を除いた種子（日本薬局方ヨクイニン）を水で煎じた後、減圧で乾燥した水製乾燥エキスを主成分とするいぼ及び皮膚のあれを防止する製剤です。
ヨクイニンの組成は、粗蛋白17.6%、粗脂肪7.2%、デンプン52.0%、灰分2.3%の他に最近の研究により、Coixenolide (C₃₈H₇₀O₄)、パルミチン酸、ミリスチン酸、リノール酸やロイシン、チロシン等のアミノ酸が含まれていることが判明しています。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(4)胃腸の弱い人。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|-------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 胃部不快感 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

いぼ、皮膚のあれ。

【用法・用量】

下記の量を食前又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	7才未満 4才以上	1/2包	3回
15才未満 7才以上	2/3包		4才未満 2才以上	1/3包	
			2才未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】〔本品1日量3包（1包1.5g）中〕

日本薬局方 ヨ ク イ ニ ン……………10.00 g
より製した水製乾燥エキス…………… 1.00 g
添加物として乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、部分アルファ化デンプン、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- 本剤は生薬を原料としたエキスをを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なる場合がありますが、効果には変わりありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 06-6211-4976
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田市中野町東2丁目1番16号