

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また必要ときに読めるよう大切に保存して下さい。

第2類医薬品

532

桂枝加竜骨牡蛎湯エキス散〔勝昌〕



使用上の注意

**漢方薬は原則として随証の方法と云って体質や病状などを参考に使用します。
しかし、正しく判断することは漢方に慣れていないと非常に難しいものです。
そこで医師、薬剤師又は登録販売者とよく相談して薬を正しく使用して下さい。



相談すること

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこ わばりに加えて、脱力感、筋肉痛があら われ、徐々に強くなる。

**3. 1ヵ月位(小児夜泣きに服用する場合には1週間位)服用しても症状が
よくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい。

**4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下
さい。

*【効能・効果】 次のような症状に有効です。

体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症：
神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

【用法・用量】

下記の量を1日3回空腹時に水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1回量
大人 (15歳以上)	1.5g(添付の秤量スプーンで1杯)
8歳以上15歳未満	大人の量の2/3
4歳以上 7歳未満	大人の量の1/2

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分・分量】

桂枝加竜骨牡蛎湯エキス散〔勝昌〕は漢方処方に従って生薬を配合し抽出して
得た水製エキスに賦形剤を加えて散剤としたものです。

本品4.5g中

ケイシ・・・・・・・・・・4.0g 日局カンゾウ・・・・・・・・・・2.0g
日局シャクヤク・・・・・・・・・・4.0g 日局リュウコツ・・・・・・・・・・2.0g
日局タイソウ・・・・・・・・・・4.0g 日局ボレイ・・・・・・・・・・3.0g
生ショウキョウ・・・・・・・・・・4.0g

上記の混合生薬より抽出した桂枝加竜骨牡蛎湯の水製エキス3.0gを含有
しています。

添加物(賦形剤)としてトウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)

【お問い合わせ先】

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がご
ざいましたら、お買い求めの薬局・販売店又は下記までご連絡頂きますようお願い
申し上げます。

製造販売元 株式会社 東洋薬行 お客様相談係
受付時間: 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)
〒113-0033 東京都文京区本郷6-19-7
電話 (03) 3813-2263 **FAX(03) 3813-0202

株式会社東洋薬行

東京都文京区本郷6-19-7