

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また必要ときに読めるよう大切に保存して下さい。

第2類医薬品

585

当帰芍薬散料エキス散〔勝昌〕



使用上の注意

*漢方薬は原則として随証的方法と云って体質や病状などを参考に使用します。
しかし、正しく判断することは漢方に慣れていないと非常に難しいものです。
そこで医師、薬剤師、登録販売者によく相談して薬を正しく使用して下さい。



相談すること

- *1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 胃腸の弱い人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- *2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- *3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書
を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】 次のような症状に有効です。

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、
めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害
(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足
腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

【用法・用量】

下記の量を空腹時に水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい。

1回量	1日服用回数
1.5g(添付のスプーンで1杯)	3回

**【成分・分量】

当帰芍薬散料エキス散〔勝昌〕は漢方処方に従って生薬を配合し抽出して得
た水製エキスに賦形剤を加えて散剤としたものです。

本品4.5g中

日局トウキ・・・3.0g 日局ブクリョウ・・・4.0g
日局センキュウ・・・3.0g 日局ビャクジュツ・・・4.0g
日局シャクヤク・・・4.0g 日局タクシャ・・・4.0g

上記の混合生薬より抽出した日局当帰芍薬散エキス3.0gを含有しています。
添加物(賦形剤)としてトウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)

【お問い合わせ先】

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がご
ざいましたら、お買い求めの薬局・販売店又は下記までご連絡頂きますようお願い
申し上げます。

製造販売元 株式会社 東洋薬行 お客様相談係
受付時間：午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)
〒113-0033 東京都文京区本郷6-19-7
電話(03)3813-2263 *FAX(03)3813-0202

株式会社東洋薬行

東京都文京区本郷6-19-7