

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

フェルピナク配合 鎮痛消炎パップ剤

コリアフターFBパップ

32枚入(8枚入×4袋) [1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量10g]

【特長】

- フェルピナクを1枚あたり70mg配合した鎮痛消炎パップ剤です。
- 医療用にも使われている成分のフェルピナクが、痛みの元となる物質の生成を抑え、肩・腰・関節などのつらい痛みに優れた効果を発揮します。
- 伸縮性のよい基布で関節にもピッタリフィットします。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人
 - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4)15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1)目の周囲、粘膜等
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口
 - (3)みずむしたむしなど又は化膿している患部
3. 連続して2週間以上使用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

| 年 齢 | 使用方法 |
|-------|--|
| 15歳以上 | 表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい |
| 15歳未満 | 使用しないで下さい |

【用法・用量に関する注意】

- (1)定められた用法・用量をお守り下さい。
- (2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

【成分・分量】(膏体100g中)

| 成 分 | 含 量 | はたら き |
|--------|------|-----------------|
| フェルピナク | 0.7g | 炎症を抑え、痛みをやわらげます |

添加物：ゼラチン、エドト酸ナトリウム水和物、マクロゴール、ポリソルベート80、β-メントール、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

(ご相談窓口)

お問い合わせのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社 ☎(0736)64-2567
時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元：**東和製薬株式会社**
和歌山県紀の川市貴志1町丸九1229番地

使用期限

製造番号

