

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

トップグロンG(滋養強壮薬)

使用上の注意【相談すること】
1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／皮ふ：発疹／消化器：吐き気・嘔吐・胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／軟便、下痢
3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(100mL)中 ニンジンエキス40.3mg(原生葉換算量600mg)、ローヤルゼリー50mg、タウリン2,000mg、乳酸カルシウム水和物310mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)10mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)25mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg 添加物：液糖、D-ソルベitol、pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エチルバニリン、バニリン、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン)●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体质○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
金属：キャップ ガラス：びん

人参エキス・ローヤルゼリー タウリン2000mg・カルシウム配合

トップグロン



第3類医薬品

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給

常盤薬品
NOEVIR GROUP

用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白樺字永谷2604-5

お問い合わせは0120-875-710まで

副作用被害救済制度 0120-149-931

100mL 280円(税別)

4987156005041

009305
ALB907

配置期限

製造番号