

服用に当たって、この説明書を必ずお読みください。
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

総合かぜ薬 モーリン®ホワイト

【非ピリン系】

かぜの諸症状には、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛みなどがあります。モーリンホワイトは、これらの症状に有効な各種の成分を配合した総合かぜ薬です。

解熱効果にすぐれた動物性生薬のゴオウと地竜を、抗炎症作用のある植物性生薬のカンゾウ、非ピリン系解熱鎮痛剤、鎮咳剤、気管支拡張剤、抗ヒスタミン剤、ビタミン剤などを配合し、かぜの諸症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。

【特長】

- 解熱作用生薬のゴオウと地竜を配合
- すぐれた解熱鎮痛作用とせき止めの作用
- のどの痛みなどの炎症を抑えるカンゾウを配合
- 胃粘膜保護剤配合で胃にやさしい
- かぜにより消耗した体力を回復させる
- ベンゾチアミン配合

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
 - (1) 他のかぜ薬、解熱鎮痛剤、鎮咳剤、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬（鼻炎用内服薬、薬物性薬、アレルギー用薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気があらわれることがある。）
4. 服用時は飲酒をしないこと
5. 長期連用しないこと

🗉 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。 高熱、むくみ、排尿困難
 - (8) 次の診療を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、結内腫瘍
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブ ジョンソン症候群) 、中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝臓障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることのあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
 - 便血、口のかき

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法及び用量

毎食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないでください。	

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方
 - 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んでしまうと食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分及び分量 1日量(6カプセル)中

成分	分量	はたらき
カンゾウエキス末	142.86mg (原生薬換算量 1,000mg)	せきをしずめ、たんを出しやすくし、のど等にかかる炎症を抑える植物性の生薬です。
ゴオウ	3mg	ウシの胆嚢もしくは胆管中に生じたもの。主成分はビリルビン系色素、胆汁酸で、解熱に効果があります。
地竜乾燥エキス	129mg (原生薬換算量 993.3mg)	解熱作用のある動物性の生薬です。
ベンゾチアミン(ビタミンB ₆ 誘導体)	10mg	吸収のよいビタミンB ₆ 誘導体で、かぜからおこるビタミンB ₆ の消耗を防ぎます。
アセトアミノフェン	600mg	解熱・鎮痛効果をあらわします。
マレイン酸クロロフェニラミン	7.5mg	鼻、のど等にかかる炎症を抑え、鼻水、かゆみ、くしゃみ等をおさえます。
リン酸ジヒドロコデイン	24mg	せきの中核に働いて、すぐれたせき止め効果をあらわします。
dI-塩酸メチルエフェドリン	60mg	気管支をひろげ、激しいせきをしずめ、のどを楽にします。
無水カフェイン	75mg	脳の血管に働いて、頭痛をやわらげます。
酸化マグネシウム	140mg	胃酸を適度に調節し、胃の粘膜を保護します。

添加物として、パレシヨデンブ、炭酸Ca、ステアリン酸Ca、セラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手とくれない所に保管すること。
- (3) 9月の容器に力がかかえないこと。(取扱いの原因になったり品質が変わる。)
- (4) 期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社 お客様相談室 ☎0120-875-710

受付時間：午前9時から12時午後1時から5時(土、日、祝日を除く)

発売元 **株式会社 太陽薬品**
大阪府高槻市野見町1番18号

製造販売元 **常盤薬品工業株式会社**
大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR ノエビアグループ