

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。
ピタシーゴールドD(ビタミン含有保健剤)
使用上の注意【相談すること】 1. 次の場合は、
直ちに服用を中止し、この製品を持って医師ま
たは薬剤師に相談すること(1)服用後、次の症
状があらわれた場合。皮膚：発疹／消化器：悪
心・嘔吐・胃部不快感(2)しばらく服用しても
症状がよくなる場合。2. 次の症状があらわ
れることがあるので、このような症状の継続ま
たは増強がみられた場合には、服用を中止し、医
師または薬剤師に相談すること／軟便・下痢
成分・分量 1日量(50mL)中 ペンフォチア
ミン(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビリン
酸エステルナトリウム(ビタミンB2)10mg、ピ
リドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン
酸アミド60mg、無水カフェイン50mg、タウリン
1,500mg、オキソアミチン末100mg、イノシ
トル300mg、カルニチン塩化物100mg、ロー
ヤルゼリーチンキ300mg(原生薬換算量300
mg)、人参乾燥エキス40.3mg(原生薬換算量
600mg)、ジョテイシエキス75mg(原生薬換算量
300mg)、セイヨウサンザシエキス17.5mg(原生
薬換算量70mg)、クコシ流エキス0.2mL(原生
薬換算量200mg)、プクリオエキス10mg(原生
薬換算量320mg)、トシシエキス10mg(原生
薬換算量100mg) 添加物：液糖、D-ソルビ
トール、ハチミツ、pH調整剤(クエン酸)、香料
(エタノール、デンプン部分加水分解物、バニリン、
l-メントール)(アルコール0.5mL以下) ●ビタ
ミンB2により尿が黄色くなることがある。

防腐剤無添加

指定医薬部外品

金属：キャップ
ガラス：びん
50mL

常盤薬品
NOEVIR GROUP

滋養強壮・栄養補給

ピタシー
ゴールド_D

有効成分 16 種 配合

タウリン 1500mg
ニンニク配合

効能・効果 ○滋養強壮
○虚弱体質○肉体的疲労・
病中病後・食欲不振・栄
養障害・発熱性消耗性
疾患・妊娠授乳期などの
場合の栄養補給 用法・
用量 成人(15才以上)
1日1回、1びん(50mL)
を服用すること。●用法・
用量を守ること。(他のビ
タミンなどを含有する製
品を同時に使用する場
合には過剰摂取などに注
意すること。) 保管および
取扱い上の注意 (1)直
射日光の当たらない涼しい所に保管するこ
と。(2)小児の手のとどかない所に保管するこ
と。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の
原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過
ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むた
め、まれに混濁を生じることがありますが、服用
には支障はありません。

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP

お問い合わせは

☎ 0120-875-710まで
www.tokiwayakuhin.co.jp

017070
KSH302

使用期限

製造番号

