

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ノーリツMAXαII(滋養強壮薬)

使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮膚:発疹/消化器:吐き気・嘔吐・胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/軟便、下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 成分・分量 1日量(100mL)中 ペンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)12mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、ニコチン酸アミド60mg、無水カフェイン50mg、イノシトール100mg、カルニチン塩化物100mg、タウリン3,000mg、乳酸カルシウム水和物310mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物200mg、ローヤルゼリーチンキ100mg(生ローヤルゼリーとして100mg)、人参乾燥エキス40.3mg(原生薬換算量600mg)、イカリソウ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg)、ショウキョウ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg)、オウギ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg) 添加物:液糖、D-ソルビトール、pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(安息香酸ベンジル、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、バニリン、メントール)(アルコール0.4mL以下)●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。

ノーリツ MAXαII

滋養強壮
肉体疲労時の栄養補給

タウリン3000mg
生薬5種類配合

オウギ
イカリソウ
人参
ショウキョウ
ローヤルゼリー

ペンフォチアミン
乳酸カルシウム水和物
アスパラギン酸K・Mg
カルニチン塩化物
イノシトール

100mL 第2類医薬品

効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むためまれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

100mL 350円(税別)

製造販売元

常盤薬品工業株式会社

大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP

お問い合わせは0120-875-710まで

www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度0120-149-931

金属:キャップ

ガラス:びん

009362

ALJ501

使用期限

製造番号